

# Seractil® die Kraft gegen Schmerz und Entzündung



|                                        | Seractil® 200 mg<br>Filmtabletten                                                                                   | Seractil® 300 mg<br>Filmtabletten                                                                                         | Seractil® forte<br>400 mg<br>Filmtabletten                                                                                          | Seractil® akut<br>400 mg<br>Pulver                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Packung</b>                         |                                    |                                         |                                                  |  |
| <b>Galenische Form</b>                 |  M1:1                              |  M1:1                                   |  M1:1                                            |  |
| <b>Packungsgrößen<br/>Kassenstatus</b> | 30, 50 Filmtabletten<br>Green Box  | 10, 30, 50 Filmtabletten<br>Green Box  | 10, 30*, 50 Filmtabletten<br>Green Box, *No Box  | 10 Sachets*<br>*No Box                                                              |
| <b>Alter</b>                           | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                  | Erwachsene                                                                                                                | Erwachsene                                                                                                                          | Erwachsene                                                                          |
| <b>Anwendungs-<br/>empfehlung</b>      | Schmerzzustände bei Kindern und Jugendlichen; leichte bis mäßig starke Schmerzen bei Erwachsenen                    | chronische Schmerzen und Entzündungen; primäre Dysmenorrhoe                                                               | stärkere, akute Schmerzen                                                                                                           | stärkere, akute Schmerzen; Patienten mit Schluckbeschwerden                         |
| <b>Dosierung</b>                       | von 8–12 Jahren:<br>1–3 × täglich 1/2 Tablette (=100 mg)<br>ab 12 Jahren:<br>1–3 × täglich 1 Tablette (=200 mg)     | 1–3 × täglich<br>300 mg Dexibuprofen                                                                                      | kurzfristig 1–3 × täglich<br>400 mg Dexibuprofen                                                                                    | kurzfristig 1–3 × täglich<br>400 mg Dexibuprofen                                    |

**analgetisch – antipyretisch – antiinflammatorisch**

**analgetisch – antipyretisch – antiphlogistisch**

## Seractil®

- ✓ **Das wirksame S(+)-Enantiomer von Ibuprofen<sup>1</sup>**  
Das pharmakologisch inaktive R(–)-Enantiomer ist nicht enthalten
- ✓ **Hohe analgetische Potenz<sup>2</sup>**  
halbe Dosierung für vergleichbare Wirkung wie mit racemischem Ibuprofen ausreichend
- ✓ **50 Prozent geringere Wirkstoffmenge<sup>2</sup>**
  - ▶ kleine Tabletten ▶ erleichterte Einnahme
  - ▶ geringere metabolische Belastung des Organismus
- ✓ **Schnelle therapeutische Plasmaspiegel und schneller Eintritt der schmerzlindernden Wirkung<sup>2</sup>**  
da nicht, wie bei racemischem Ibuprofen, aktive und inaktive Moleküle um die Bindung an die Cyclooxygenase in Konkurrenz treten

Für Fragen: Gebro Pharma GmbH  
A-6391 Fieberbrunn, Tel: 05354/5300-0  
pharma@gebro.com · www.gebro.com  
Stand: Dezember 2020



(1) Beubler E., Kompendium d. medikamentösen Schmerztherapie, 7. Auflage, 2020 (2) Bartl W. et al., Inflammopharmacology 2003, Vol 11, 4–6

**Seractil 200mg-Filtabletten, Seractil 300mg-Filtabletten, Seractil forte 400mg-Filtabletten, Seractil akut 400mg Pulver zur Herstellung einer Suspension**  
**Zusammensetzung:** Filtablette: Eine Filtablette enthält 200/300/400mg Dexibuprofen. **Hilfsstoffe:** Tablettankern: Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, Carmellose Calcium, hochdisperses Siliciumdioxid, Talk. Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid(E-171), Glyceroltriacetat, Talk, Macrogol 6000. **Pulver:** Ein Beutel enthält 400mg Dexibuprofen. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 2,4g Saccharose. **Hilfsstoffe:** Saccharose, Zitronensäure, Orangenaroma, Saccharin, Hochdisperses Siliziumdioxid, Natriumdodecylsulfat. **Anwendungsgebiete:** Seractil 200 mg / 300 mg / forte 400 mg-Filtabletten werden angewendet bei Erwachsenen. Zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen und Entzündungen bei Osteoarthritis/Arthrose; Regelschmerzen (primäre Dysmenorrhoe), leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Schmerzen des Bewegungsapparates, Kopf- oder Zahnschmerzen, schmerzhaften Schwellungen und Entzündungen nach Verletzungen, und zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von rheumatoider Arthritis, wenn andere, längerfristige Therapieoptionen (Basistherapie: Disease Modifying Antirheumatic Drugs, DMARDs) nicht in Betracht gezogen werden. **Pulver:** Symptomatische Behandlung von Schmerzen und Entzündungen bei Osteoarthritis/Arthrose; Akute symptomatische Behandlung von Regelschmerzen (primäre Dysmenorrhoe); Symptomatische Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen, wie Schmerzen des Bewegungsapparates oder Zahnschmerzen. **Gegenanzeigen:** Dexibuprofen darf nicht angewendet werden bei Patienten: mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Dexibuprofen, gegen andere NSAR oder gegen einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile; bei denen Stoffe mit ähnlicher Wirkung (z.B. Acetylsalicylsäure oder andere NSAR) Asthmaanfälle, Bronchospasmen, akute Rhinitis, Nasenpolypen, Urtikaria oder angioneurotische Ödeme auslösen; mit einer Vorgeschichte von gastrointestinalen Blutungen oder Perforationen, die im Zusammenhang mit einer vorhergehenden NSAR-Therapie steht; mit bestehenden oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen peptischen Ulzera oder Blutungen (mindestens zwei voneinander unabhängige Episoden von nachgewiesener Ulzeration oder Blutung); mit zerebrovaskulären oder anderen aktiven Blutungen; mit aktivem Morbus Crohn oder aktiver Colitis ulcerosa; mit schwerer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse IV); mit schwerer Nierenfunktionsstörung (GFR < 30 ml/min); mit schwerer Leberfunktionsstörung; ab dem sechsten Monat der Schwangerschaft. **ATC-Code:** M01AE14. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Packungsgrößen:** 200 mg Filtabletten: 30, 50 Stück. 300/forte 400 mg Filtabletten: 10, 30, 50 Stück. 10 Beutel pro Schachtel mit einem gelblichen Pulver. **Kassenstatus:** Tabletten: Green Box (400 mg 30 Stück: No Box). Pulver: No-Box. **Zulassungsinhaber:** Gebro Pharma GmbH, A-6391 Fieberbrunn. **Stand der Information:** Juli 2015. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.